



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ**  
**EBSERH – HOSPITAL DE CLÍNICAS - GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA**  
**COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL - COREMU**  
**Vagas Remanescentes - Edital nº 07/2018 – Prova Objetiva: 11/03/2018**

INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO
-----------	-------	-------------------

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:	ORDEM
---	-------

## 301 – Atenção Hospitalar - Enfermagem

### INSTRUÇÕES

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. A prova é composta de 50 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. Não será permitido ao candidato:
  - a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas.
  - b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.
  - c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o atendimento especial.
  - d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.
  - e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
  - f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.
  - g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 3.6.5 do Edital.
  - h) Emprestar materiais para realização das provas.

**Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo.**
9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

Conteúdo Geral

Conhecimentos Específicos

**DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS**

✕ .....

RESPOSTAS									
01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -	41 -	46 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -	42 -	47 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -	43 -	48 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -	44 -	49 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -	45 -	50 -



## CONTEÚDO GERAL

**01 - Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), considere as seguintes afirmativas:**

1. É uma formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde estabelecida pela Constituição de 1988.
2. Não é um serviço ou uma instituição, mas um conjunto de unidades, de serviços e ações que interagem para um fim comum. Esses elementos integrantes do sistema referem-se, ao mesmo tempo, às atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde.
3. Garante, como única condição para se ter direito de acesso aos serviços e ações de saúde, precisar deles.
4. Pode realizar cobrança de complementações para procedimentos mais complexos, desde que se comprove a condição do usuário em arcar com essa parcela dos custos.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- ▶ c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

**02 - Sobre os princípios doutrinários e organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS), numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.**

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universalidade</li> <li>2. Equidade</li> <li>3. Integralidade</li> <li>4. Resolubilidade</li> <li>5. Descentralização</li> </ol> | <p>( ) É a garantia de atenção à saúde, por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão. Desta forma, o indivíduo passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como àqueles contratados pelo poder público.</p> <p>( ) É o reconhecimento na prática dos serviços de que cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma comunidade; as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formam também um todo indivisível e não podem ser compartimentalizadas e as unidades prestadoras de serviço, com seus diversos graus de complexidade, formam também um todo indivisível configurando um sistema capaz de prestar assistência integral.</p> <p>( ) É entendida como uma redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto.</p> <p>( ) É a exigência de que, quando um indivíduo busca o atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível da sua competência.</p> <p>( ) É assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras.</p> |
|--|---|

**Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.**

- a) 1 – 2 – 5 – 4 – 3.
- b) 2 – 5 – 4 – 3 – 1.
- c) 4 – 5 – 3 – 1 – 2.
- d) 2 – 3 – 4 – 5 – 1.
- ▶ e) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.

**03 - Em relação à Lei Orgânica da Saúde de 1990, considere as seguintes afirmativas:**

1. A integralidade é o princípio de que tanto as ações preventivas como as curativas devem ter sua total resolubilidade na atenção básica.
2. As redes regionalizadas, ainda vistas como hierarquizadas, consistiram em uma proposta organizacional para o SUS que foi regulamentada somente em 2011, pelo Decreto 7.508.
3. A centralização da gestão do sistema foi a diretriz organizativa assumida pelo Ministério da Saúde, em 1988, enquanto que os municípios assumiram a descentralização.
4. A universalidade é o princípio que garante, a todos os cidadãos brasileiros, o acesso aos serviços de saúde de acordo com suas necessidades e sem discriminações.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- ▶ b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

**04 - Sobre a Atenção Primária à Saúde (APS), assinale a alternativa correta.**

- ▶ a) Deve ser a porta de entrada obrigatória ou preferencial do sistema de saúde.
- b) É o primeiro nível do sistema de saúde porque lida com os casos mais simples.
- c) A função de filtro do sistema (*gatekeeper*) diminui os custos, mas não melhora os indicadores de saúde.
- d) A proporção de médicos generalistas e especialistas em um sistema de saúde não tem relação com a morbimortalidade.
- e) Deve centrar-se na promoção de saúde e não nas doenças.

**05 - São características do processo de trabalho das equipes de atenção básica, EXCETO:**

- a) Realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade, tendo em vista a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro atendimento às urgências.
- ▶ b) Realizar atenção à saúde somente no ambiente da Unidade Básica de Saúde.
- c) Desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população, no desenvolvimento de autonomia, individual e coletiva, e na busca por qualidade de vida pelos usuários.
- d) Desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos e redes de apoio social voltados para o desenvolvimento de uma atenção integral.
- e) Definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das UBS e das equipes.

**06 - A respeito da Estratégia Saúde da Família (ESF), identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:**

- ( ) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família.
- ( ) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas.
- ( ) O cadastramento de cada profissional de saúde deve ser em apenas uma das Equipes da Estratégia Saúde da Família, exceção feita somente ao profissional médico, que poderá atuar em, no máximo, duas equipes e com carga horária total de 40 horas semanais.
- ( ) A Equipe de Saúde Bucal (ESB) deve ser composta por cirurgião-dentista, técnico em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal e técnico de prótese dentária.
- ( ) As equipes do Consultório na Rua deverão realizar suas atividades de forma itinerante, desenvolvendo ações na rua, em instalações específicas, na unidade móvel e também nas instalações das Unidades Básicas de Saúde do território onde está atuando, sempre articuladas e desenvolvendo ações em parceria com as demais equipes de atenção básica do território.

Assinale alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- a) V – V – F – V – F.
- b) F – F – V – V – V.
- c) V – V – F – F – V.
- d) F – V – V – V – F.
- ▶ e) V – V – V – F – V.

**07 - Sobre os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), é correto afirmar:**

- ▶ a) Poderão compor os NASF os seguintes profissionais da saúde: assistente social; profissional de educação física; farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; nutricionista; psicólogo; terapeuta ocupacional; médico veterinário; profissional com formação em arte e educação (arte educador); e profissional de saúde sanitária.
- b) Os NASF foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações especializadas na atenção à saúde.
- c) São exemplos de ações de apoio desenvolvidas pelos profissionais dos NASF: discussão de casos extremos, atendimento individualizado com priorização da demanda espontânea, construção de planos de tratamento fragmentado com os demais profissionais de saúde, educação permanente, intervenções clínicas individualizadas.
- d) A composição de cada um dos NASF será definida pelos gestores municipais, seguindo os critérios de prioridade identificados a partir dos dados epidemiológicos e das necessidades locais e das equipes de saúde que serão apoiadas, com priorização das especialidades médicas em detrimento das categorias profissionais.
- e) Todas as atividades podem ser desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde, Academias da Saúde, Unidades de Pronto Atendimento, serviços especializados ou hospitais de referência e em outros pontos necessários do território.

**08 - Em relação à gestão da clínica na Atenção Primária à Saúde (APS), assinale a alternativa correta.**

- a) A divisão da agenda dos profissionais em função dos programas, como saúde da criança, mulher, hipertensos e diabéticos, melhora o acesso na APS.
- b) Tempos de consulta fixos facilitam o atendimento centrado nas necessidades da população.
- c) O pré-agendamento de consultas e de retornos a longo prazo facilita o controle dos problemas de saúde da população e melhora o acesso na APS.
- ▶ d) A organização da agenda dos profissionais da APS deve ser flexível e privilegiar o atendimento para o mesmo dia ou dia seguinte.
- e) O agendamento de consultas por telefone ou internet não apresenta bons resultados de satisfação do usuário na APS.

09 - Em relação à Rede de Urgência e Emergência no SUS, considere as seguintes afirmativas:

1. As UPAs são estruturas de complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde e a rede hospitalar.
2. O objetivo principal das UPAs é a internação de pacientes que necessitam de cuidados prolongados.
3. As UPAs objetivam garantir o acolhimento aos pacientes, intervir em sua condição clínica e contrarreferenciá-los para os demais pontos de atenção da RAS.
4. Depois de encaminhado para a UPA, o usuário passa a ser de responsabilidade das equipes dessa unidade de pronto atendimento.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- ▶ b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

10 - Prevenção Quaternária é um termo da década de 1980 cada vez mais utilizado para se referir à ação feita para identificar uma pessoa ou população em risco de supermedicalização, protegê-las de uma intervenção de serviços de saúde invasiva e sugerir procedimentos científica e eticamente aceitáveis. Na origem, prevenção quaternária se referia àquelas situações em que o paciente se sente enfermo, mas os profissionais de saúde não encontram uma doença. Nos últimos anos tem sido compreendida como sinônimo de medicalização, da progressiva incorporação de situações cotidianas pelas profissões e indústria da saúde. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- a) Prevenir uma medicalização excessiva significa, nesse caso, evitar o uso de medicamentos desnecessários.
- b) A pessoa que se preocupa em fazer exames preventivos (*check-up*) diminui os riscos de medicalização.
- ▶ c) Saber lidar com a incerteza, ouvir mais do que fazer e compartilhar as decisões com os pacientes são ações de prevenção quaternária.
- d) Os principais responsáveis por esse fenômeno são os meios de comunicação.
- e) Atividades coletivas e multiprofissionais protegem de medicalização ou intervenções desnecessárias.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11 - Os curativos variam em relação ao tipo de ferida, ao tipo de material e a sua aplicação. Em relação às úlceras por pressão, é importante, ao escolher o curativo, considerar o estágio da úlcera, o tipo de tecido e a função que se deseja do curativo. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. O filme transparente é autoadesivo, proporciona ambiente úmido e pode ser usado para pequenas feridas superficiais não infectadas.
2. Os curativos com hidrocoloide formam um gel à medida que a secreção é absorvida e promovem o desbridamento autolítico em feridas necróticas.
3. Os curativos com hidrogel são úteis nas feridas dolorosas, pois acalmam a dor e não aderem ao leito da ferida.
4. Curativos com alginato são indicados para feridas com grande exsudato e que necessitem de tamponamento.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

12 - A fenilcetonúria é um erro inato do metabolismo da fenilalanina que ocorre em um a cada 12 a 15 mil recém-nascidos no Brasil. Na ausência do tratamento durante a infância, a maioria das pessoas com essa desordem desenvolverá retardo mental severo. Em relação ao período para a realização do rastreamento, realizado pelo chamado teste do pezinho, é correto afirmar que a coleta de sangue deve ser realizada:

- a) após 12 horas do nascimento e antes do sétimo dia de vida.
- b) após 24 horas do nascimento e antes do décimo dia de vida.
- c) na primeira consulta na unidade básica de saúde.
- d) antes do primeiro mês de vida.
- ▶ e) após 48 horas do nascimento e antes do sétimo dia de vida.

13 - Em 2014, o Ministério da Saúde do Brasil ampliou a faixa etária para a vacinação contra o vírus do papiloma humano (HPV). Essa vacina contribui para a prevenção de:

- a) câncer de cólon.
- b) lesões ulcerativas pré-cancerígenas na boca.
- ▶ c) câncer do colo uterino.
- d) sarcoma de Kaposi.
- e) doença maligna dos glóbulos brancos do sangue.

14 - A Escala de Braden é amplamente usada para avaliação de risco. Essa escala está indicada para avaliar o risco:

- a) cirúrgico.
- b) de câncer.
- c) de infarto agudo do miocárdio.
- d) de quedas.
- ▶ e) de úlceras por pressão.

15 - Quando o paciente experimenta mais de uma alteração sensorial, há risco de prejuízos ao relacionamento eficaz, inclusive no ambiente hospitalar. Em relação aos déficits sensoriais mais comuns, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- ( ) A tontura e o desequilíbrio são condições comuns em idosos e, geralmente, resultantes de disfunção vestibular.
- ( ) A presbiacusia pode contribuir para distúrbios na comunicação.
- ( ) A distorção das linhas verticais e material de leitura borrado são sinais iniciais de degeneração macular.
- ( ) A xerostomia frequentemente interfere na acuidade visual.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – V – V.
- b) F – V – F – V.
- c) V – F – F – F.
- ▶ d) V – V – V – F.
- e) F – F – V – V.

16 - Considerando a exposição do trabalhador ao vírus da hepatite C, é correto afirmar:

- ▶ a) Não há tratamento profilático após a exposição.
- b) O trabalhador não vacinado deverá receber a primeira dose de vacina no período de 24 horas após a exposição.
- c) O tratamento precoce deve ser iniciado, mas não interfere na prevenção de infecção crônica.
- d) O afastamento do trabalhador exposto é obrigatório pelo período de 6 meses a partir da exposição.
- e) É recomendada a vacina em associação com imunoglobulina.

17 - Em observação à Lei do Exercício Profissional de Enfermagem no Brasil, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/87 e relativo às atribuições da profissão, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- ( ) O exercício da atividade de Enfermagem é privativo de enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiro e só será permitido ao profissional inscrito no Conselho Regional de Enfermagem da respectiva região.
- ( ) Ao enfermeiro incumbe, privativamente, o planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de Enfermagem.
- ( ) Ao técnico de enfermagem incumbe assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de Enfermagem.
- ( ) Ao auxiliar de enfermagem incumbe auxiliar o enfermeiro na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado grave.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- ▶ a) V – V – V – F.
- b) V – F – F – V.
- c) F – V – V – F.
- d) V – F – V – V.
- e) F – V – F – V.

18 - O Conselho Federal de Enfermagem, por meio da Resolução COFEN 259/2001, delibera sobre a Modalidade de Residência em Enfermagem, aos profissionais enfermeiros inscritos no referido conselho. Em relação a esse tema, considere as seguintes afirmativas:

1. Os programas de residência deverão ter duração mínima de 18 meses, correspondendo a um total mínimo de duas mil novecentas e sessenta horas, em regime não inferior a 40 horas semanais.
2. Exigência de um trabalho científico, na forma de monografia, artigo científico para publicação, ou equivalente é requisito para a conclusão da residência e da consequente certificação.
3. O contingente de enfermeiros residentes poderá ser considerado para fins de dimensionamento de pessoal de enfermagem nas instituições de saúde.
4. Os programas de residência deverão assegurar um mínimo de 40% da carga horária total e semanal para atividades teórico-práticas.

Assinale a alternativa correta.

- ▶ a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

19 - A obesidade é fator de risco para doenças crônicas, diabetes e câncer e importante problema de saúde pública em países desenvolvidos. A deposição de tecido adiposo central é clinicamente estimada por meio da medida da circunferência da cintura, tomada no ponto médio entre a crista ilíaca e o bordo inferior da costela. É correto afirmar que os pontos de corte para obesidade central são:

- a) >95 cm em mulheres e >105 cm em homens.
- ▶ b) >88 cm em mulheres e >102 cm em homens.
- c) >82 cm em mulheres e >90 cm em homens.
- d) >75 cm em mulheres e >85 cm em homens.
- e) >62 cm em mulheres e >87 cm em homens.

20 - Os padrões de morbimortalidade das doenças transmissíveis têm sido modificados nas últimas décadas no mundo. A introdução de novas doenças, as modificações genéticas e a disseminação global são desafios a serem enfrentados e exigem medidas de prevenção e controle. Considerando a principal forma de transmissão, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a da esquerda.

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Transmissão sanguínea.     | ( ) Hepatite C.                          |
| 2. Transmissão por gotículas. | ( ) Hepatite A.                          |
| 3. Transmissão fecal-oral.    | ( ) Varicela.                            |
| 4. Transmissão aérea.         | ( ) Doença meningocócica.                |
| 5. Transmissão por contato.   | ( ) Infecção pelo papiloma vírus humano. |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 1 - 4 - 3 - 2 - 5.
- b) 5 - 2 - 1 - 4 - 3.
- c) 2 - 1 - 4 - 5 - 3.
- ▶ d) 1 - 3 - 4 - 2 - 5.
- e) 2 - 3 - 1 - 5 - 4.

21 - O alívio da dor é um direito humano. Enfermeiros devem, ética e legalmente, avaliar e controlar a dor, com base em princípios científicos. Nesse sentido, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- ( ) Os opioides interferem na função intestinal.
- ( ) Os sinais vitais não são indicadores sensíveis da presença de dor.
- ( ) O uso crônico de anti-inflamatórios não esteroides em idosos aumenta o risco de hemorragia digestiva e insuficiência renal.
- ( ) Escalas de dor podem ser usadas para comparar a dor entre pacientes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V - F - V - F.
- b) F - V - V - F.
- c) F - F - F - V.
- d) V - V - F - V.
- ▶ e) V - V - V - F.

22 - A lavagem gástrica é um procedimento de urgência que deve ser realizado o mais precocemente possível, quando indicado, nos casos de ingestão acidental ou intencional de substâncias tóxicas ou materiais sólidos, a fim de diminuir a exposição e absorção da substância em questão. Com relação à indicação, ou não, de lavagem gástrica, de acordo com a substância ingerida ou condições clínicas do paciente, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a da esquerda.

- |   |   |
|---|---|
| 1. A lavagem gástrica é indicada.       | ( ) Solventes.  |
| 2. A lavagem gástrica é contraindicada. | ( ) Suspeita de ingestão de material sólido com pontas. |
|   | ( ) Glasgow menor ou igual a 8 em paciente entubado.    |
|   | ( ) Pacotes contendo drogas.                            |
|   | ( ) Hematêmese volumosa.                                |
|   | ( ) Hidrocarbonetos.                                    |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 1.
- ▶ b) 2 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2.
- c) 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1.
- d) 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 1.
- e) 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2.

23 - No Brasil, um caso suspeito de tuberculose pulmonar é definido quando um indivíduo tem sintomatologia clínica sugestiva. Assinale a alternativa que apresenta essa sintomatologia.

- a) Tosse por duas semanas ou mais, febre, perda de peso ou apetite, ou imagem radiológica sugestiva.
- b) Tosse por três semanas ou mais e febre, perda de apetite ou imagem radiológica sugestiva.
- c) Tosse com expectoração purulenta por duas semanas ou mais, perda de peso, febre, ou imagem radiológica sugestiva.
- d) Tosse por três semanas ou mais, febre, perda de peso ou apetite.
- ▶ e) Tosse com expectoração por três semanas ou mais, febre, perda de peso ou apetite, ou imagem radiológica sugestiva.

24 - No momento de uma crise convulsiva, consiste medida imediata de assistência hospitalar:

- a) diferenciar de crise histérica ou psicogênica.
- b) chamar o médico responsável.
- ▶ c) proteger o paciente e garantir a permeabilidade das vias aéreas.
- d) administrar os fármacos antiepiléticos de acordo com a prescrição médica.
- e) investigar abandono de tratamento antiepilético.

25 - Etiologicamente, o diabetes é definido como tipo 1, tipo 2, outros tipos específicos de diabetes e diabetes gestacional. Considerando as características dos diabetes tipo 1 e tipo 2, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a da esquerda.

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Diabetes tipo 1. | ( ) Indica processo de destruição da célula beta. |
| 2. Diabetes tipo 2. | ( ) Apresentação, em geral, abrupta.              |
|                     | ( ) Tendência a hiperglicemia grave.              |
|                     | ( ) O processo autoimune é frequente.             |
|                     | ( ) Cetoacidose rara.                             |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 2 - 1 - 1 - 2 - 2.
- ▶ b) 1 - 1 - 1 - 1 - 2.
- c) 1 - 2 - 1 - 2 - 1.
- d) 1 - 2 - 2 - 2 - 1.
- e) 2 - 1 - 1 - 1 - 2.

26 - A sequência de atendimento à pessoa em parada cardiorrespiratória (PCR) interfere no sucesso da reanimação. Identifique a sequência correta dos procedimentos a serem executados, segundo a ordem cronológica de atendimento:

- ( ) Abertura das vias aéreas.
- ( ) Compressões torácicas.
- ( ) Ventilação.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta, de cima para baixo.

- ▶ a) 2 - 1 - 3.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 1 - 3 - 2.
- d) 2 - 3 - 1.
- e) 3 - 1 - 2.

27 - A correta aferição da pressão arterial é frequentemente negligenciada pela não observação de cuidados técnicos. Em relação a esse tema, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- ( ) Na ausência de manguitos de tamanho adequado à circunferência do braço, recomenda-se a correção da pressão arterial.
- ( ) Ao se detectarem valores discrepantes de pressão arterial entre o braço direito e o esquerdo, deve-se considerar o valor mais baixo.
- ( ) Deve ser evitado o fumo e o consumo de bebida com cafeína nos 30 minutos que precedem a verificação da pressão arterial.
- ( ) É considerada pressão arterial normal em adultos maiores de 18 anos quando sistólica <130 mmHg e diastólica <85 mmHg.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V - V - F - F.
- b) F - F - V - V.
- c) F - V - V - F.
- ▶ d) V - F - V - V.
- e) V - V - F - V.

28 - Considerando que a obesidade está relacionada com doença coronariana, hipertensão arterial, diabetes tipo 2, acidente vascular cerebral, alguns tipos de câncer e com apneia do sono, recomenda-se seu rastreamento em todos os pacientes adultos e crianças maiores de seis anos, por meio do índice de massa corpórea (IMC). É considerada obesidade quando o IMC é superior a:

- a) 29.
- ▶ b) 30.
- c) 33.
- d) 36.
- e) 40.

29 - A mortalidade materna é tema de interesse mundial e reflete condicionantes de saúde de acordo com cada país e região. Em relação aos conceitos de morte materna, de acordo com a Organização Mundial da Saúde e com o Ministério da Saúde do Brasil, identifique se as seguintes afirmativas são verdadeiras (V) ou falsas (F):

- ( ) Mortalidade materna se refere à morte que ocorre durante a gestação ou dentro de 30 dias após o término da gestação.
- ( ) Mortalidade materna se refere à morte que ocorre devido a causas acidentais ou incidentais.
- ( ) A razão da mortalidade materna é obtida pela razão de óbitos maternos com o número de nascidos vivos em determinada área geográfica e período de tempo.
- ( ) No Brasil, as mortes maternas têm as causas diretas como determinantes mais frequentes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – F – V – F.
- b) F – V – V – F.
- ▶ c) F – F – V – V.
- d) V – V – F – V.
- e) V – F – V – V.

30 - Na gestação de alto risco, é fundamental a identificação dos problemas existentes e o diagnóstico das doenças ligadas à gestação, a fim de iniciar o tratamento e tomar os cuidados necessários. A respeito do tema, considere as seguintes situações:

1. Idade abaixo de 15 anos e acima de 40 anos.
2. Desnutrição, hipertensão, infecção.
3. Ser portadora do vírus da imunodeficiência humana.
4. Viver em condições de risco e de extrema pobreza.

São situações que a mulher apresenta e que, ao engravidar, podem colocá-la sob predisposição natural à gestação de alto risco:

- ▶ a) 1, 2, 3 e 4.
- b) 1 e 2 apenas.
- c) 1, 3 e 4 apenas.
- d) 3 e 4 apenas.
- e) 2 e 4 apenas.

31 - Assinale a alternativa que corresponde ao sinal caracterizado por dor acentuada quando a mão que comprime o abdome é retirada bruscamente.

- a) Sinal de Korotkoff.
- b) Sinal de Fergusson.
- c) Sinal do cacifo.
- ▶ d) Sinal de Blumberg.
- e) Sinal de Faget.

32 - Na primeira avaliação do recém-nascido, o enfermeiro observa ausência de esforço respiratório, frequência cardíaca superior a 100 batimentos por minuto, tônus flácidos, careta ao reflexo de irritabilidade e cor corporal rosa com extremidades cianóticas. Para esse caso, é correto atribuir, pelo Índice de Apgar:

- a) 2.
- ▶ b) 4.
- c) 6.
- d) 7.
- e) 8.

33 - Frente à identificação de um ou mais sinais e sintomas de reação transfusional, o procedimento imediato a ser adotado é:

- a) Verificar os sinais vitais.
- b) Registrar a ocorrência.
- ▶ c) Interromper a infusão.
- d) Coletar amostra sanguínea para análise.
- e) Manter o acesso venoso.

34 - Na avaliação da pessoa hipertensa, a mensuração do risco cardiovascular é de fundamental importância para orientar a conduta terapêutica e o prognóstico. Assinale a alternativa que contém a escala que pode ser utilizada para cálculo do escore de risco.

- a) Escore de Aldrete-Kroulick.
- ▶ b) Escore de Framingham
- c) Escore de Kaplan.
- d) Escore de CRIB.
- e) Escore de Snapp II.

35 - A seleção do local de aplicação de medicamentos por via intramuscular deve considerar a idade da criança e seu desenvolvimento muscular. A respeito do assunto, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- |                                |     |   |
|--------------------------------|-----|---|
| 1. Região ventroglútea.        | ( ) | Indicada apenas para crianças acima de 7 meses. |
| 2. Face anterolateral da coxa. | ( ) | Indicada para recém-nascidos.                   |
| 3. Região deltoideana.         | ( ) | Contraindicada em crianças menores de 10 anos   |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.

- ▶ a) 1 – 2 – 3.
- b) 2 – 1 – 3.
- c) 1 – 3 – 2.
- d) 2 – 3 – 1.
- e) 3 – 2 – 1.

36 - Considerando as características das principais classes de psicofármacos, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- |                       |     |   |
|-----------------------|-----|---|
| 1. Neurolépticos.     | ( ) | Indicados para sintomas de fobia e obsessivo-compulsivo.        |
| 2. Benzodiazepínicos. | ( ) | Efeitos extrapiramidais podem decorrer do seu uso.              |
| 3. Antidepressivos.   | ( ) | A anorexia é um efeito indesejado comum.                        |
|                       | ( ) | A tolerância e dependência a esses fármacos deve ser observada. |
|                       | ( ) | Indicados para sintomas psicóticos.                             |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 2 – 2 – 1 – 3 – 1.
- b) 1 – 1 – 3 – 1 – 3.
- c) 3 – 3 – 1 – 2 – 2.
- ▶ d) 3 – 1 – 3 – 2 – 1.
- e) 2 – 1 – 2 – 3 – 2.

37 - A hipertensão sistêmica constitui um problema de saúde pública e, nos últimos anos, cresceu o interesse nesse distúrbio entre crianças e adolescentes. É correto afirmar que, nessa população, a hipertensão é definida como:

- a) Presença de pressão arterial sistólica ou diastólica persistentemente no 75º percentil ou acima dele.
- b) Presença de pressão arterial sistólica ou diastólica persistentemente no 80º percentil ou acima dele.
- c) Presença de pressão arterial sistólica ou diastólica persistentemente no 85º percentil ou acima dele.
- ▶ d) Presença de pressão arterial sistólica ou diastólica persistentemente no 90º percentil ou acima dele.
- e) Presença de pressão arterial sistólica ou diastólica persistentemente no 95º percentil ou abaixo dele.

38 - A hanseníase é uma doença crônica e infectocontagiosa cujo primeiro e principal sintoma consiste em manchas de cor parda, pouco visíveis, com limites imprecisos, baixa sensibilidade térmica, perda de pelos e ausência de transpiração. Seu principal agente etiológico, o *Mycobacterium leprae*, é transmitido por:

- ▶ a) Contato com gotículas das vias aéreas superiores.
- b) Contato com a mancha ou ferida.
- c) Sangue.
- d) Urina e fezes.
- e) Contato com a pele.

39 - Considerando a legislação brasileira relativa à segurança na prescrição e administração de medicamentos, em relação às prescrições verbais, considere as seguintes afirmativas:

1. São restritas a situações de urgência/emergência.
2. Devem ser escritas imediatamente no prontuário após a administração do medicamento.
3. A prescrição verbal deve ser validada pelo prescritor assim que possível.
4. O prescritor deve falar o nome, a dose e a via de administração do medicamento de forma clara e essas informações devem ser confirmadas verbalmente pelo receptor da ordem verbal, previamente à administração do medicamento.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

40 - O conhecimento, pelo enfermeiro, da etiologia, sinais e sintomas, exames diagnósticos, tratamento e intervenções de enfermagem contribuem para a detecção precoce e qualidade de vida da pessoa acometida por desvios do sistema neurológico. Considerando esse contexto assistencial em saúde, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Doença de Alzheimer.</li> <li>2. Esclerose múltipla.</li> <li>3. Doença de Parkinson.</li> <li>4. Síndrome de Guillain-Barré.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>( ) Doença do Sistema Nervoso Central, crônica e lentamente progressiva. A mobilidade física prejudicada é o principal diagnóstico de enfermagem.</li> <li>( ) Causa mais comum de demência em idosos, caracteriza-se por atrofia acentuada da córtex cerebral e perda de neurônios corticais e subcorticais. Os cuidados de enfermagem focalizam-se na sustentação das capacidades remanescentes do cliente.</li> <li>( ) Doença degenerativa, crônica e progressiva com perda de neurônios na região conhecida como substância negra, resultando em prejuízos aos movimentos voluntários.</li> <li>( ) Polirradiculopatia desmielinizante inflamatória aguda, de natureza autoimune, com evolução geralmente benigna. As ações de enfermagem são direcionadas, principalmente, para a manutenção do padrão respiratório e mobilidade física.</li> </ol> |
|--|--|

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 1 – 4 – 3 – 2.
- b) 3 – 2 – 1 – 4.
- ▶ c) 2 – 1 – 3 – 4.
- d) 4 – 3 – 2 – 1.
- e) 2 – 1 – 4 – 3.

41 - A Trombose Venosa Profunda (TVP) resulta da agregação plaquetária que ocorre mais frequentemente nas veias das extremidades inferiores do corpo humano. Considerando que as ações de enfermagem nesse contexto são direcionadas à identificação de fatores de risco, ações de prevenção, detecção precoce de sinais e sintomas e auxílio no tratamento, considere as afirmativas a seguir.

1. A obesidade é fator de risco para TVP, inclusive em pessoas com idade inferior a 40 anos.
2. A deambulação precoce em pós-operatório de cirurgia abdominal é um fator de risco para a TVP.
3. Heparina não fracionada é a droga de escolha para prevenir o tromboembolismo venoso pós-operatório.
4. A suspensão abrupta de anticoagulantes e o uso de anticoncepcionais orais podem levar à hipercoagulabilidade.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- ▶ b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

42 - Em casos de ingestão de substâncias tóxicas, a lavagem gástrica está indicada dentro do período de uma hora da ingestão para diminuir a exposição à substância tóxica e sua absorção pelo organismo. A respeito do assunto, é correto afirmar:

- a) O sucesso na retirada das substâncias tóxicas é inversamente proporcional à rapidez com que a lavagem é realizada.
- b) A vantagem do uso de sonda nasogástrica é o fato de ser calibrosa, facilitando a retirada de substâncias tóxicas.
- c) A posição ideal do paciente é o decúbito lateral direito.
- d) Durante a lavagem gástrica, manter o paciente com a cabeça em nível inferior ao corpo predispõe à broncoaspiração.
- ▶ e) A lavagem gástrica é contraindicada em casos de ingestão de cáusticos, com exceção do paraquate, para o qual é indicada por ter efeito sistêmico importante.

43 - As doenças transmissíveis representam desafios às políticas nacionais de prevenção e controle mediante a introdução de novas doenças, modificações genéticas, rápida disseminação decorrente do fenômeno da globalização, ressurgimento de doenças historicamente controladas e persistência de outras. Com relação à doença e respectiva medida de prevenção, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Influenza pandêmica.</li> <li>2. Cólera.</li> <li>3. Dengue.</li> <li>4. Hanseníase.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>( ) Combate ao vetor.</li> <li>( ) Vacinação.</li> <li>( ) Detecção precoce de casos.</li> <li>( ) Abastecimento de água potável.</li> </ol> |
|---|---|

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.

- ▶ a) 3 – 1 – 4 – 2.
- b) 1 – 4 – 3 – 2.
- c) 2 – 3 – 4 – 1.
- d) 2 – 4 – 3 – 1.
- e) 3 – 1 – 2 – 4.

44 - A disponibilidade de opções para o diagnóstico de agravos à saúde baseado em evidências científicas contribui para maior acurácia e segurança do paciente. Nesse contexto, é correto afirmar que a prova do laço positiva é um sinal preditivo de:

- a) doença hipertensiva específica da gestação (DHEG).
- b) fascíte plantar.
- ▶ c) febre hemorrágica da dengue.
- d) febre reumática aguda.
- e) doença orgânica localizada em trato intestinal.

45 - Higiene das mãos é um termo geral que se refere a qualquer ação de higienizar as mãos para prevenir a transmissão de micro-organismos e evitar que pacientes e profissionais de saúde adquiram infecções relacionadas à assistência à saúde. A respeito do assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- ( ) A fricção das mãos com preparação alcoólica contendo um agente umectante agride menos a pele do que a higiene com sabonete líquido e água.
- ( ) A finalidade da higiene simples das mãos é remover a microbiota transitória e reduzir a microbiota residente.
- ( ) Sabonete líquido e preparação alcoólica para a higiene das mãos não devem ser utilizados concomitantemente.
- ( ) As mãos devem ser higienizadas antes e após o uso de luvas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – F – V – V.
- b) V – V – V – F.
- ▶ c) V – F – V – V.
- d) V – V – F – F.
- e) F – V – F – V.

46 - O Modelo do Queijo Suíço apresenta uma abordagem sistêmica para o gerenciamento de situações específicas durante a assistência à saúde. O modelo mostra que quando não há camadas de queijo (barreiras), os buracos se comunicam: as barreiras representam os profissionais atualizados, o uso de protocolos clínicos e o uso de checklist, entre outros. Com base nessas informações, assinale a alternativa que corresponde à teoria exemplificada por meio do Modelo do Queijo Suíço:

- a) Teoria da Qualidade PDCA (*Plan, Do, Check, Act*/Planejar, Fazer, Verificar, Checar).
- ▶ b) Teoria do Erro.
- c) Teoria Quântica.
- d) Teoria do Caos.
- e) Teoria dos Nove Certos.

47 - Drogas quimioterápicas podem agir sobre a medula óssea alterando sua função e causando leucopenia, anemia e trombocitopenia. A equipe de enfermagem deve estar atenta à principal consequência da trombocitopenia, que corresponde ao risco para:

- a) infecção.
- b) deficiência nutricional.
- c) quedas.
- ▶ d) sangramento.
- e) alteração de comportamento.

48 - Considerando a segurança do trabalhador como elemento-chave no processo de assistência à saúde e o disposto na Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde (NR 32), identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- ( ) É vetado ao trabalhador o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho.
- ( ) Vestimenta adequada deve ser fornecida sem ônus para o empregado, com possibilidade de exposição a agentes biológicos.
- ( ) São vedados o reencepe e a desconexão manual de agulhas.
- ( ) A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido gratuitamente programa de imunização ativa contra tétano, difteria e hepatite B.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – F – V – V.
- b) V – V – F – F.
- c) V – F – V – F.
- d) F – V – F – V.
- ▶ e) V – V – V – V.

49 - Extravasamento de drogas é definido como o escape de drogas do vaso sanguíneo para os tecidos adjacentes. A respeito dos fatores relacionados à morbidade decorrente do extravasamento, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- ( ) Droga vesicante corresponde a fármaco que provoca irritação severa quando infiltrado fora do vaso sanguíneo.
- ( ) O tipo de droga e a concentração são fatores relacionados à morbidade.
- ( ) Queimação, desconforto local e edema são reações imediatas ao extravasamento de drogas vesicantes.
- ( ) A localização do extravasamento é fator relacionado à morbidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – V – F.
- b) V – F – V – F.
- ▶ c) V – V – V – V.
- d) F – F – F – V.
- e) F – V – F – F.

50 - A hipertermia maligna é definida por uma rápida elevação da temperatura corporal e contrações musculares intensas, podendo ocorrer quando a pessoa:

- a) tem infecção.
- ▶ b) recebe anestesia geral.
- c) apresenta grande volume de perda de sangue.
- d) está em jejum prolongado.
- e) desenvolve desequilíbrio hidroeletrólítico.