



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
EBSERH – HOSPITAL DE CLÍNICAS - GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL - COREMU
Vagas Remanescentes - Edital nº 14/2019 – Prova Objetiva: 13/03/2019

INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO
ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:		ORDEM

301 – Atenção Hospitalar - Enfermagem

INSTRUÇÕES

- Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
 - Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
 - A prova é composta de 50 questões objetivas.
 - Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
 - A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
 - Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
 - O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
 - Não será permitido ao candidato:
 - Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados **OBRIGATORIAMENTE** dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas.
 - Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.
 - Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o atendimento especial.
 - Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.
 - Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 - Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.
 - Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 3.3.5 do Edital.
 - Emprestar materiais para realização das provas.
- Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo.**
- A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
 - Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
 - Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

Conteúdo Geral

Conhecimentos Específicos

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

✕

RESPOSTAS									
01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -	41 -	46 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -	42 -	47 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -	43 -	48 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -	44 -	49 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -	45 -	50 -

CONTEÚDO GERAL

01 - Qual dos princípios e diretrizes do SUS, descritos na Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 1990, representa a redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços entre vários grupos de governo?

- a) Universalização do direito à saúde.
- ▶ b) Descentralização com direção única para o sistema.
- c) Integralidade da atenção à saúde.
- d) Participação popular visando o controle social.
- e) Resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

02 - No campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), considere os seguintes itens:

1. **Formulação da política de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos.**
2. **Fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.**
3. **Fiscalização do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.**
4. **Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano.**

O SUS é responsável pelas ações:

- a) 1 e 2 apenas.
- b) 2 e 3 apenas.
- c) 3 e 4 apenas.
- ▶ d) 1, 2 e 4 apenas.
- e) 1, 3 e 4 apenas.

03 - Sobre o financiamento da saúde no Brasil, é correto afirmar:

- ▶ a) O gasto público com o SUS é menor do que a soma dos gastos privados com planos, seguros-saúde e desembolso direto.
- b) Na maioria dos países com sistemas nacionais universais de saúde, o gasto privado é maior do que o gasto público.
- c) Os dois modelos principais de financiamento de sistemas públicos de saúde são o bismarckiano, que recebe recursos de impostos gerais, e o Beveridgeano, que utiliza os seguros-saúde como fonte.
- d) A Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) é a principal fonte de recursos para o SUS.
- e) Apenas o governo federal deve aplicar, por lei, um percentual mínimo no SUS. Não há a mesma exigência para estados e municípios.

04 - Sobre o Controle Social no Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo.

1. **O conselho de saúde é um órgão colegiado, deliberativo e permanente do SUS em cada esfera de governo. Faz parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, dos estados e do governo federal.**
2. **O conselho de saúde deve funcionar mensalmente, ter ata que registre suas reuniões e infraestrutura que dê suporte ao seu funcionamento.**
3. **O segmento dos usuários deve ser paritário com os demais segmentos. Isso quer dizer que 50% dos integrantes do conselho de saúde têm que ser usuários, 25% dever ser profissionais de saúde e os outros 25% devem ser de gestores e prestadores de serviço.**
4. **O conselho de saúde somente ter caráter consultivo na organização dos serviços, das ações, programas e políticas de saúde.**

Assinale a alternativa correta.

- ▶ a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- d) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

05 - A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um modelo de Atenção Primária à Saúde (APS) adotado no Brasil. Sobre a ESF, assinale a alternativa correta.

- a) É responsável pelo cuidado programado das pessoas do seu território enquanto as Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) atendem à demanda espontânea.
- b) É mais efetiva quando prioriza as atividades coletivas em detrimento das individuais.
- c) A atenção domiciliar é uma de suas atividades e deve ser realizada em função do planejamento da equipe e não de acordo com a demanda dos usuários.
- ▶ d) Produz melhores indicadores de saúde quando comparada às unidades básicas tradicionais.
- e) É uma estratégia voltada para as populações de baixa renda e de maior vulnerabilidade social.

06 - A equipe multiprofissional da Estratégia da Saúde da Família é composta pelos seguintes profissionais:

- a) Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser acrescentados a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de psicologia e terapia ocupacional.
- b) Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser acrescentados a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais nutricionista e farmacêutico.
- ▶ c) Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser acrescentados a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal.
- d) Médico especialista em Atenção Básica ou médico de Atenção Primária a Saúde, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser acrescentados a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais nutricionista e farmacêutico.
- e) Médico especialista em Atenção Básica ou médico de Atenção Primária a Saúde, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser acrescentados a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal.

07 - A Carta de Ottawa (1986) representa um amadurecimento do campo da promoção da saúde e agrega à noção de determinantes sociais da saúde o conceito político de:

- a) prevenção.
- b) hierarquização de serviços de saúde.
- c) universalidade.
- ▶ d) empoderamento.
- e) estilo e hábitos de vida.

08 - Com relação às políticas de saúde, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Assistência médica mediante contribuição individual prévia, até 1988. | () Sistema Único de Saúde. |
| 2. Detecção de mudanças nos fatores determinantes ou condicionantes da saúde individual e coletiva. | () Vigilância da Saúde. |
| 3. Acesso de todos os cidadãos aos serviços de saúde, a partir de 1988. | () INAMPS. |
| 4. Mudança do modelo assistencial na atenção básica, a partir dos anos 1990. | () Vigilância em Saúde. |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 3 – 2 – 1 – 4.
- b) 1 – 2 – 3 – 4.
- c) 1 – 4 – 3 – 2.
- d) 2 – 3 – 4 – 1.
- ▶ e) 3 – 4 – 1 – 2.

09 - Sobre a Atenção Primária à Saúde, é correto afirmar:

- a) Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual, que abrange a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, e a redução de danos.
- b) Tem como objetivo de desenvolver uma atenção fragmentada que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
- ▶ c) Deve possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.
- d) É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho profissional isolado, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
- e) Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades espontâneas de saúde de maior frequência e relevância em seu território, observando critérios, como ordem de chegada, e estabelecendo cotas para populações necessitadas.

10 - Assinale a alternativa cujos itens são considerados atributos centrais da Atenção Primária à Saúde (APS).

- a) Acesso, coordenação do cuidado, vigilância em saúde.
- b) Abrangência do cuidado, orientação comunitária, atenção programática.
- ▶ c) Longitudinalidade, acesso ou primeiro contato, abrangência do cuidado.
- d) Competência cultural, saúde da mulher, centralidade na família.
- e) Controle social, educação em saúde, prevenção e promoção.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11 - A tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil e seu diagnóstico é importante elemento para o controle e prevenção. Assinale a alternativa que corresponde à confirmação clínico-laboratorial de tuberculose pulmonar bacilífera.

- a) Uma cultura positiva.
- b) Uma baciloscopia direta positiva associada a imagem radiológica sugestiva.
- c) Uma baciloscopia direta positiva associada a uma cultura positiva.
- ▶ d) Duas baciloscopias diretas positivas.
- e) Uma baciloscopia direta positiva.

12 - Frente à transição epidemiológica no Brasil nas últimas décadas, considere as afirmativas a seguir:

1. **Mudanças no perfil epidemiológico englobam aumento da morbimortalidade pelas doenças e agravos não transmissíveis e pelas causas externas.**
2. **Observa-se mortalidade dominante em substituição à morbidade.**
3. **Ocorrência de deslocamento da carga de morbimortalidade dos grupos mais jovens para grupos mais idosos.**
4. **O prolongamento da expectativa de vida e o envelhecimento populacional estão relacionados com a melhoria das condições econômicas e sociais.**

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- d) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.

13 - O paciente cirúrgico pode agregar comorbidades e uso regular de medicamentos, cabendo ao cirurgião e anestesista a suspensão ou ajuste das doses no período pré-operatório, promovendo o processo de harmonização de medicamentos durante a hospitalização. Em relação aos efeitos dos fármacos durante a cirurgia, considere as seguintes afirmativas:

1. **Tratamentos à base de gengibre, ginkobiloba e ginseng podem aumentar a suscetibilidade a hemorragias.**
2. **O uso prolongado de corticosteroides causa a atrofia adrenal e pode reduzir a capacidade do organismo de resistir a estresses.**
3. **O uso continuado de aspirina pode aumentar o risco de hemorragia.**
4. **Anti-inflamatórios inibem a agregação plaquetária e prolongam o tempo de sangramento.**

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

14 - O rastreamento, detecção e diagnóstico precoces de doenças é tema relevante na prática da atenção à saúde no Brasil. Considerando a população infantil, é correto afirmar que as doenças para as quais há indicação de rastreamento são:

- a) fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito.
- ▶ b) anemia falciforme, perda auditiva e fenilcetonúria em recém-natos; hipotireoidismo congênito; detecção de ambliopia, estrabismo e acuidade visual em crianças menores de cinco anos.
- c) anemia falciforme em recém-natos; hipotireoidismo congênito; detecção de ambliopia, estrabismo, acuidade visual e diabetes tipo 1 em crianças menores de cinco anos.
- d) fenilcetonúria e anemia falciforme em recém-natos; diabetes tipo 1.
- e) hipotireoidismo congênito, estrabismo e diabetes tipo 1.

15 - No atendimento a pessoa em parada cardiorrespiratória, o número e profundidade das compressões torácicas constituem fatores determinantes à sobrevivência. Qual é a recomendação quanto à frequência das compressões e sua profundidade em adultos?

- a) Frequência mínima de 80 compressões por minuto e profundidade das compressões de, no mínimo, 1 centímetro.
- b) Frequência mínima de 90 compressões por minuto e profundidade das compressões de, no mínimo, 3 centímetros.
- ▶ c) Frequência mínima de 100 compressões por minuto e profundidade das compressões de, no mínimo, 5 centímetros.
- d) Frequência mínima de 120 compressões por minuto e profundidade das compressões de, no mínimo, 7 centímetros.
- e) Frequência mínima de 140 compressões por minuto e profundidade das compressões de, no mínimo, 9 centímetros.

16 - Em 2013, o Ministério da Saúde do Brasil instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente e instituiu protocolos básicos, publicados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O protocolo para a prática de higienização de mãos em serviços de saúde preconiza que as elas devem ser higienizadas em momentos essenciais e necessários, de acordo com o fluxo de cuidados assistenciais. Quanto ao número de momentos para a higienização das mãos preconizados pela ANVISA, assinale a alternativa correta.

- a) 2.
- b) 3.
- c) 4.
- ▶ d) 5.
- e) 6.

17 - Traumatismos superficiais são assim conceituados por lesar a pele e tecido celular subcutâneo, podendo atingir aponeuroses e músculos. O tratamento visa à cicatrização, devendo ser usada a cobertura de acordo com o estágio da ferida. A respeito da ação principal de cada cobertura, numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda.

- | | | |
|------------------------------|-----|--|
| 1. Hidrocoloides. | () | Absorção de exudato. |
| 2. Ácidos graxos essenciais. | () | Quimiotaxia. |
| 3. Alginato de cálcio. | () | Ação bactericida imediata e ação bacteriostática residual. |
| 4. Sulfadiazina de prata. | () | Desbridamento autolítico. |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 2 – 1 – 4 – 3.
- ▶ b) 3 – 2 – 4 – 1.
- c) 1 – 3 – 2 – 4.
- d) 1 – 2 – 3 – 4.
- e) 3 – 1 – 4 – 2.

18 - O concentrado de plaquetas pode ser obtido a partir de unidade individual de sangue total ou por aferese, coletadas de doador único, e sua indicação está associada, basicamente, à plaquetopenia. Considerando as restrições de seu uso, de acordo com o Ministério da Saúde, é correto afirmar que a administração de concentrado de plaquetas é indicada para pacientes com:

- a) Coagulopatia intravascular disseminada.
- b) Dengue hemorrágica.
- c) Sarcoma de Kaposi.
- d) Falência medular por anemia aplástica, independentemente do resultado da contagem de plaquetas.
- ▶ e) Circulação extracorpórea por tempos superiores a 90-120 minutos, independentemente do resultado da contagem de plaquetas.

19 - Assinale a alternativa correta em relação à escala Braden, utilizada pela enfermagem para a avaliação preditiva de risco.

- a) A escala prediz o risco de queda do paciente.
- ▶ b) Percepção sensorial, umidade, nutrição mobilidade e atividade física são parâmetros de avaliação.
- c) Esta escala é recomendada, exclusivamente, para pacientes adultos.
- d) A escala de Braden resultou da adaptação da escala de Norton.
- e) A pontuação máxima é de 25 escores.

20 - O escore de Apgar é utilizado na avaliação do recém-nascido. Em relação a esse indicador, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () Avalia seis sinais clínicos do recém-nascido.
- () Deve ser aplicado no primeiro e quinto minutos de vida após o nascimento.
- () Para cada sinal clínico, atribui-se uma pontuação de zero a dois.
- () Norteia a necessidade de reanimação de criança asfíxiada.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – F – F.
- b) F – V – V – V.
- c) V – F – F – V.
- ▶ d) F – V – V – F.
- e) V – V – F – V.

21 - As hepatites virais são doenças causadas por diferentes vírus hepatotrópicos, possuem distribuição universal e são observadas diferenças regionais de acordo com o agente etiológico. Considerando os vírus mais relevantes, sua forma de transmissão e medidas de prevenção, numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda.

- | | | |
|-------------------------|-----|---|
| 1. Vírus da Hepatite A. | () | A transmissão está relacionada às condições de saneamento básico. |
| 2. Vírus da Hepatite B. | () | O risco é maior para a transmissão vertical. |
| 3. Vírus da Hepatite C. | () | Não há forma crônica de hepatite causada por este vírus. |
| | () | A transmissão não é prevenível pela vacina. |
| | () | Há maior chance de transmissão vertical quando coinfeção com o vírus da imunodeficiência adquirida. |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 1 – 3 – 1 – 2 – 3.
 b) 2 – 1 – 3 – 4 – 2.
 ►c) 1 – 2 – 1 – 3 – 3.
 d) 2 – 3 – 2 – 3 – 1.
 e) 3 – 2 – 3 – 1 – 1.

22 - O sarampo é uma doença infecciosa e prevenível por meio da vacinação. Em relação a esta patologia, considere as afirmativas a seguir:

1. O período de incubação varia de 10 a 20 dias.
2. Durante o período catarral ocorre a transmissão da doença.
3. Manchas de Koplik precedem as erupções cutâneas.
4. O agente causador é vírus.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
 b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
 c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
 d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
 ►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

23 - O Conselho Federal de Enfermagem delibera sobre a residência de enfermagem por meio da seguinte resolução e ano:

- a) 388/2011.
 b) 196/2004.
 ►c) 259/2001.
 d) 34/2007.
 e) 466/1999.

24 - A canulação arterial é indicada para monitorar pacientes em pós-operatório de cirurgias cardíacas e aquelas com risco de grandes alterações da pressão arterial sistêmica, quando da necessidade de rigoroso controle da pressão e gases arteriais. A verificação do fluxo sanguíneo é importante para prevenção de processo isquêmico da mão. Para verificar se a artéria ulnar promove irrigação satisfatória da mão utiliza-se o teste:

- a) Babinski.
 b) Coombs.
 c) Dob-Hoff.
 d) Beer-Lambert.
 ►e) Allen.

25 - A intensidade de ações preventivas de doenças cardiovasculares deve ser determinada pelo risco cardiovascular estimado para cada paciente, o qual pode ser classificado em baixo, médio e alto risco. Indicadores de risco indeterminado por meio do exame clínico em mulheres com idade ≥ 55 anos e homens com idade ≥ 45 anos exigem investigação por meio de exames laboratoriais. É correto afirmar que são exames complementares mínimos necessários frente ao exposto:

- a) Hemograma e glicemia de jejum.
 b) Glicemia de jejum e creatinina.
 c) Teste de tolerância à glicose e hemograma.
 ►d) Colesterol total e glicemia de jejum.
 e) HDL e hemograma.

26 - A Aids é uma doença pandêmica grave e a redução da transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana (HIV) é uma das prioridades do Programa Nacional de DST e Aids. Considerando essa prioridade, assinale a alternativa que corresponde a fator de risco associado à transmissão vertical do HIV.

- a) Relações sexuais desprotegidas.
 b) Compartilhamento e reutilização de seringas e agulhas.
 c) Acidente ocupacional com instrumento perfurocortante.
 ►d) Gestação em mulheres HIV positivo.
 e) Múltiplos parceiros sexuais.

- 27 - A relação entre a força de trabalho e a complexidade do cuidado implica qualidade da assistência prestada. Nesse tema, é correto afirmar que o *Nursing Activities Score (NAS)* é um instrumento de medida de carga de trabalho de enfermagem na assistência a pacientes hospitalizados em unidades de:
- a) quimioterapia.
 - ▶ b) terapia intensiva.
 - c) neonatologia.
 - d) cardiologia.
 - e) pediatria.
- 28 - A meta geral do tratamento de acidente vascular encefálico/acidente vascular cerebral é:
- ▶ a) minimizar a lesão cerebral aguda.
 - b) reconhecer o acidente vascular.
 - c) transportar a vítima para hospital de referência.
 - d) controlar a pressão arterial.
 - e) iniciar a administração do ativador do plasminogênio tecidual recombinante.
- 29 - A senhora L.B.M. realizou o exame de Papanicolaou e no laudo consta lesão intraepitelial de alto grau e carcinoma *in situ*. Do ponto de vista histopatológico, essa neoplasia intraepitelial cervical (NIC) é classificada como:
- a) NIC I.
 - b) NIC II.
 - ▶ c) NIC III.
 - d) NIC IV.
 - e) NIC V.
- 30 - Ao atender um operário com história de trabalho durante 15 anos em empresa que usava o amianto como matéria-prima, a enfermeira deve estar atenta ao risco do paciente para:
- a) dislipidemia.
 - b) hipertensão arterial sistêmica.
 - c) ambliopia.
 - ▶ d) câncer de pulmão.
 - e) diabetes.
- 31 - A administração de vitamina K por via intramuscular no bebê logo após o parto tem por objetivo prevenir:
- a) doença gonocócica.
 - b) hepatite C.
 - c) tétano neonatal.
 - d) defeitos da hemoglobina.
 - ▶ e) doença hemorrágica do recém-nascido.
- 32 - A dor é uma experiência individual, subjetiva e desagradável, sendo necessária sua avaliação, intervenção e monitoração. Fisiologicamente, a dor nociceptiva (normal) compreende cinco etapas ou processos. A inibição da dor corresponde ao quarto processo, também denominado:
- a) percepção.
 - ▶ b) modulação.
 - c) transdução.
 - d) transmissão.
 - e) sinapse.
- 33 - A respeito dos preceitos éticos e legais da profissão, é vetado aos profissionais da equipe de enfermagem:
- a) preparar e administrar medicamentos prescritos verbalmente.
 - ▶ b) prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública.
 - c) comunicar ao paciente qual o medicamento que está sendo administrado.
 - d) notificar eventos adversos relacionados ao uso de medicamentos.
 - e) discutir a prevenção das interações medicamentosas com a equipe multiprofissional.
- 34 - Quadro clínico, caracterizado por convulsões tônico-clônicas generalizadas ou coma em mulher, que ocorre, especificamente, durante a gravidez, parto ou puerpério imediato, com qualquer quadro hipertensivo, não causado por doença convulsiva, corresponde a:
- a) epilepsia.
 - b) crise tireotóxica.
 - ▶ c) eclampsia.
 - d) síndrome de Hellp.
 - e) psicose puerperal.

35 - O exame físico é parte fundamental do cuidado de enfermagem pediátrico, com vistas à prevenção e detecção precoce de distúrbios de saúde. A hiperextensão da cabeça, com dor à flexão, é um sinal de alerta indicativo de:

- a) lesão ao músculo esternomastóideo.
- ▶ b) irritação meníngea.
- c) ambliopia.
- d) hipocalcemia.
- e) síndrome de Cushing.

36 - A respeito de situações testemunhadas ou suspeitas de aspiração de corpo estranho por crianças, considere as seguintes condições:

1. A criança é incapaz de emitir som.
2. A tosse é ineficaz.
3. Há dificuldade respiratória progressiva.
4. Os sons respiratórios apresentam estridor.

A tentativa de desobstrução das vias aéreas é recomendada nas condições:

- a) 1 e 2 apenas.
- b) 1 e 3 apenas.
- c) 3 e 4 apenas.
- d) 2, 3 e 4 apenas.
- ▶ e) 1, 2, 3 e 4.

37 - A vacinação está associada à prevenção primária, faz parte das políticas públicas no Brasil e deve ser considerada nas ações de prevenção secundária em pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. Para se vacinarem, pacientes em uso de antiagregantes plaquetários (ácido acetilsalicílico, por exemplo) não necessitam suspender essa medicação ou mudar a via de administração da vacina.
2. As principais vacinas destinadas a cardiopatas são aquelas contra infecções respiratórias.
3. Pacientes em uso de doses elevadas de imunossupressores deverão ter a vacinação adiada.
4. A vacina pneumocócica não reduz a mortalidade de portadores de DCNT.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- ▶ d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

38 - A obesidade é um problema de saúde pública no mundo e crescente no Brasil. Esse agravo está associado com hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e diabetes mellitus, entre outras enfermidades. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () A obesidade é definida quando o índice de massa corpórea for maior ou igual a 30 kg/m² em adultos.
- () Adultos com índice de massa corpórea maior ou igual a 35 kg/m² são considerados na condição de obesidade grau III.
- () Adultos com índice de massa corpórea maior a 30 kg/m² com comorbidades e que não responderam a outras modalidades de tratamento podem ser candidatos à cirurgia para a redução de peso.
- () Índice de massa corpórea maior que 40 kg/m² é condição para avaliação de cirurgia para a redução de peso.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- ▶ a) V – F – F – V.
- b) V – V – V – F.
- c) V – F – V – V.
- d) F – V – V – F.
- e) F – F – F – V.

39 - O enfermeiro, ao realizar pesquisas com seres humanos, deve observar as normas nacionais, incluindo a aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos participantes da pesquisa. Esse termo visa atender ao princípio ético da:

- a) não maleficência.
- b) justiça.
- c) equidade.
- ▶ d) autonomia.
- e) beneficência.

40 - De acordo com o Decreto nº 94.406/87, que dispõe sobre o exercício da enfermagem no Brasil, incumbe privativamente ao enfermeiro:

- a) elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde.
- b) execução de programas e atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco.
- ▶ c) execução de cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- d) elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem.
- e) desenvolvimento e aplicação de tecnologias inovadoras com vistas a atender às necessidades de saúde da população.

41 - Presbiopia, nictúria e tempo de reação lentificado são condições fisiológicas que reduzem a segurança, quando da hospitalização, do seguinte grupo de pessoas:

- a) dependentes químicos em abstinência.
- b) gestantes.
- c) pacientes em pós-operatório imediato.
- ▶ d) idosos.
- e) pacientes vítimas de acidente vascular encefálico.

42 - Os sinais vitais são indicadores do estado de saúde e sofrem variações que devem ser conhecidas pelo enfermeiro para a adequada avaliação. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () A temperatura corporal pode sofrer alterações de acordo com o ritmo circadiano.
- () Níveis reduzidos de hemoglobina aumentam a frequência respiratória.
- () A posição supina reduz a frequência do pulso.
- () A pressão arterial volta aos níveis basais entre 15 a 30 minutos após a pessoa parar de fumar.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – V – F.
- b) V – F – F – V.
- ▶ c) V – V – F – V.
- d) V – F – V – F.
- e) F – V – F – V.

43 - O erro de medicação pode determinar uso inapropriado do fármaco e causar danos ao indivíduo. Várias são as estratégias para promover o uso seguro de medicamentos. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. O direito de recusar-se a executar prescrição em caso de identificação de erro de registro ou ilegibilidade está amparado legalmente no Brasil.
2. Em situações de emergência, é facultada a prescrição verbal.
3. A expressão “uso contínuo”, sem prazo para reavaliação, pode ser utilizada, exclusivamente, para prescrições ambulatoriais.
4. O uso da expressão “se necessário” na prescrição deve ter, minimamente, as seguintes informações adicionais: dose, posologia e dose máxima diária.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- ▶ b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

44 - A saturação de oxigênio no sangue pode ser medida indiretamente por meio de oxímetro de pulso, e sua leitura pode ser afetada por diversos fatores. Para alguns fatores não existem evidências científicas que os comprovem como intervenientes, permanecendo como mitos. Assinale a alternativa que apresenta um desses mitos.

- a) Movimentação do paciente.
- b) Fontes externas de luz.
- ▶ c) Hipertensão arterial.
- d) Corantes intravasculares.
- e) Icterícia.

45 - Ao admitir um paciente com história de dor e uso de opioides há dois dias, o enfermeiro deve estar atento aos possíveis efeitos colaterais do tratamento farmacológico. Assinale a alternativa que identifica um desses efeitos.

- ▶ a) Constipação.
- b) Dependência física.
- c) Taquicardia.
- d) Incontinência urinária.
- e) Parestesia em extremidades.

46 - Ao admitir um paciente para cirurgia eletiva, o enfermeiro verifica a ausência do termo de consentimento cirúrgico. O procedimento adequado a ser adotado nesse caso é:

- a) encaminhar o paciente de volta à unidade de internação.
- b) solicitar ao enfermeiro supervisor para providenciar o termo.
- c) encaminhar o paciente para a sala cirúrgica e registrar a ocorrência.
- d) solicitar que o paciente assine o termo.
- ▶ e) solicitar ao cirurgião para providenciar o termo.

47 - Pacientes adultos ou pediátricos com estado crítico de saúde demandam seguro acesso venoso central para administração de medicamentos, hemotransfusão, nutrição parenteral e reposição eletrolítica, entre outros procedimentos. O tipo de cateter que apresenta maior relação custo-benefício e menores riscos, dispensa a utilização de sala cirúrgica e exige apenas raios X simples para a confirmação de sua localização após ser inserido é o cateter:

- ▶ a) venoso central de inserção periférica de longa permanência.
- b) venoso central totalmente implantado de longa permanência.
- c) venoso central semi-implantado de longa permanência.
- d) de Swan-Ganz.
- e) de Hickman.

48 - Visando a segurança ambiental e do trabalhador de saúde, cuidados especiais devem ser adotados com quimioterápicos. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

- () Os resíduos de quimioterapia devem ser encaminhados para o processo de incineração.
- () Equipos, algodão, gaze e frascos vazios ou com resíduos de quimioterápicos devem ser desprezados em um recipiente rígido e impermeável, identificado corretamente com a simbologia padronizada que identifica o resíduo tóxico.
- () Em situações de acidentes pessoais com quimioterápico, o vestuário deve ser removido imediatamente quando houver contaminação; as áreas de pele atingidas devem ser lavadas com água e sabão neutro e as mucosas irrigadas com água ou solução isotônica.
- () Nas áreas de preparação, armazenamento e administração e para o transporte, deve ser mantido um “kit” de derramamento identificado e disponível, contendo, no mínimo: luvas de procedimento, avental impermeável, compressas, proteção respiratória e ocular, sabão, recipiente identificado para recolhimento de resíduos e descrição do procedimento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – F – V.
- b) F – F – V – F.
- ▶ c) V – F – V – V.
- d) F – V – F – V.
- e) F – V – V – F.

49 - A hemorragia pode representar complicação gestacional, sendo mais frequentemente relacionada a descolamento prematuro de placenta e a placenta prévia, que correspondem a até 50% dos diagnósticos. É importante conhecer os fatores relacionados para traçar o plano de acompanhamento de enfermagem à gestante. Para placenta prévia, o principal fator de risco é:

- ▶ a) cesariana prévia.
- b) uso de drogas.
- c) idade materna avançada.
- d) trauma abdominal.
- e) rotura prematura de membranas ovulares.

50 - Considera-se que todos os pacientes atendidos em serviços de saúde têm risco para quedas. O Ministério da Saúde recomenda a avaliação do risco à admissão e diariamente para todos os pacientes. Ao avaliar um paciente recém-admitido no serviço de emergência, a enfermeira o classifica como de baixo risco para queda e orienta medidas preventivas. São condições para essa classificação, paciente:

- a) acomodado em maca e sem fator de risco específico para quedas.
- ▶ b) acamado, restrito ao leito, totalmente dependente da ajuda de terceiros.
- c) independente e com fator de risco para queda.
- d) acomodado e se locomovendo em cadeira de rodas.
- e) realizando as atividades e se locomovendo sem auxílio de terceiros, com história prévia de queda.