



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – COREMU
COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS

Edital n.º 51/2022 – Prova Objetiva – 15/11/2022

INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO
ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:		ORDEM

811 – Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais – Odontologia

INSTRUÇÕES

1. **Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.**
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. **Antes de iniciar a prova**, confira a numeração de todas as páginas.
3. A prova desta fase é composta de 40 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
7. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
8. **Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que:**
 - a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização;
 - b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes ou outro candidato;
 - c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;
 - d) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;
 - e) descumprir as instruções contidas no caderno de prova;
 - f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação;
 - g) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;
 - h) não se submeter ao controle de detecção de metal;
 - i) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do Processo Seletivo;
 - j) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova;
 - k) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova, de acordo com o subitem 7.13 do edital;
 - l) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o subitem 7.14 do edital (os três últimos candidatos de cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente).
9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o material de prova.
10. Após a entrega do material ao aplicador de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob pena de ser excluído do Processo Seletivo.
11. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS.

✕

RESPOSTAS							
01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -

CONHECIMENTOS GERAIS

01 - A teoria da Determinação Social da Saúde busca explicar as relações entre a sociedade e o processo saúde-doença. Com base nela, assinale a alternativa correta.

- a) Está vinculada aos comportamentos individuais e às condições de vida e trabalho.
- ▶ b) Sociedades de classes determinam diferentes possibilidades de viver, adoecer e morrer.
- c) É um conjunto de fatores que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e os fatores de risco na população.
- d) Diferenças entre classes sociais são marcadas pelo grau de equidade na distribuição de renda.
- e) Permite identificar que fortalecer a resistência das mulheres é o mais efetivo no enfrentamento de vulnerabilidades.

02 - Com relação ao surgimento e às raízes históricas da Medicalização Social, assinale a alternativa correta.

- ▶ a) Foi fundamental para o surgimento da Medicalização Social a revisão do significado da saúde e a extensão da normatização e interferência médica na organização da população e de suas condições de vida.
- b) Contribuiu para a ocorrência da Medicalização Social a generalização do cuidado médico, tornando-se uma abordagem estatal, principalmente na Europa, a partir do século XVIII.
- c) Foram importantes para o surgimento da Medicalização Social as péssimas condições de vida no campo, que levaram a um quadro de miséria e condições de vida extremamente precárias.
- d) Apesar de ainda não ocupar papel significativo nas ações estatais relacionadas à saúde-doença, no século XIX a medicina já possuía uma eficiência técnica para abordar as principais condições de morbimortalidade.
- e) A Medicalização Social necessita de uma normatização médica, que se dá com a intervenção predominantemente de caráter assistencial, curativo.

03 - Assinale a alternativa correta quanto às competências das direções de saúde pertencentes ao Sistema Único de Saúde estabelecidas pela Lei n.º 8.080, de 1990.

- a) Compete à direção estadual e, em caráter complementar, à direção municipal executar serviços de vigilância sanitária e epidemiológica.
- b) É responsabilidade da direção nacional identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade.
- c) É responsabilidade das direções municipais normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados.
- ▶ d) Cabe à direção nacional formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- e) Fica a cargo da direção estadual acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde.

04 - Com relação às políticas de saúde brasileiras antes do surgimento do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.

- a) As políticas de previdência financiaram a construção de uma grande rede de unidades de saúde (postinhos) privadas pelo país a partir da década de 1920.
- b) O sistema de saúde previdenciário se consolidou de forma independente, mas foi regulamentado pelo Estado através do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social.
- ▶ c) A previdência constituiu um sistema de saúde que, ao invés de responder às desigualdades da realidade social e de saúde da sociedade brasileira, acabava por reproduzir essas desigualdades e iniquidades.
- d) A assistência à saúde previdenciária atendia toda a população, mas de forma desigual, garantindo o atendimento hospitalar apenas para aqueles que possuíam trabalho formal.
- e) O Estado era o maior comprador da assistência à saúde previdenciária, o que garantia um grande poder de decisão sobre as políticas de saúde.

05 - Sobre a consolidação da Saúde da Família no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.

- a) Em 2004, a região Norte possuía a maior proporção de população coberta por equipes de Saúde da Família, seguida pelas regiões Sudeste e Nordeste.
- b) De 1998 a 2004, houve expansão importante em todas as regiões, mas com cobertura maior nos municípios com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) alto.
- c) A partir do ano 2000, a ampliação da cobertura pela Saúde da Família ocorreu em grande parte em municípios maiores, fato que começou a se modificar recentemente.
- d) O Projeto de Expansão e Consolidação do Saúde da Família (PROESF) era estruturado em três componentes principais: expansão da estratégia em municípios de pequeno porte, desenvolvimento de recursos humanos e regulamentação.
- ▶ e) O Programa Saúde da Família tendia a favorecer um trabalho territorializado, com participação em atividades na comunidade e bons resultados na cobertura de ações programáticas.

06 - Com relação ao novo modelo de financiamento da Atenção Primária à Saúde, o Previne Brasil, assinale a alternativa correta.

- a) O Piso da Atenção Básica fixo passou a reunir o maior volume de recursos dentro da previsão orçamentária da área de atenção básica do Ministério da Saúde.
- b) A alocação de recursos passa a basear-se no cadastramento das pessoas, o qual definirá tanto o montante de recursos repassados quanto o estímulo para criação de novas equipes de Saúde da Família.
- ▶ c) Na capacitação ponderada, o valor unitário por cadastro válido diferencia-se (dada a característica de ponderação) em duas classificações: caracterização do usuário (critérios demográficos e socioeconômicos) e tipologia municipal.
- d) A diferenciação por cadastro de pessoas com vulnerabilidade e perfil demográfico determina um peso diferenciado de 1,3 cada, podendo o peso ser acumulado.
- e) O valor transferido pelo Piso da Atenção Básica fixo passou da média de R\$ 25,50/habitante/ano para R\$ 50,50/habitante/ano.

07 - Com relação à Política Nacional de Atenção Básica de 2017, assinale a alternativa correta.

- a) As composições das equipes de Saúde da Família e de Atenção Básica permanecem as mesmas, mas com quantidades de profissionais e cargas horárias semanais diferentes.
- b) Flexibilizou a carga horária dos profissionais médicos na equipe de Saúde da Família de 40 para 20 horas, buscando equacionar a dificuldade de fixação desses profissionais nas equipes.
- c) As ações realizadas pelos Agentes de Combate às Endemias se fundem com as dos Agentes Comunitários de Saúde, passando a existir apenas um profissional mais capacitado dentro das equipes.
- d) A presença dos Agentes Comunitários de Saúde passa a ser requerida na composição mínima das equipes de Atenção Básica, garantindo as ações educativas e de promoção da saúde.
- ▶ e) Para a equipe de Atenção Básica, a soma da carga horária, por categoria, deve ser, no mínimo, de 40 horas; a carga horária mínima de cada profissional deve ser de 10 horas; e o número máximo de profissionais por categoria deve ser três.

08 - De acordo com a Lei n.º 8.142, de 1990, para que os municípios, os estados e o Distrito Federal recebam recursos do Fundo Nacional de Saúde, é necessário que possuam:

- a) Fundação de Saúde.
- b) Secretaria de Saúde.
- c) Conferência de Saúde.
- ▶ d) Conselho de Saúde com composição paritária.
- e) Comissão de elaboração de Políticas Públicas.

09 - Com relação às políticas de saúde brasileiras do período entre 1995 e 2002, assinale a alternativa correta.

- ▶ a) O Programa Saúde da Família tornou-se prioritário na agenda do Ministério da Saúde e do Governo Federal.
- b) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), voltada para os mercados de assistência médica suplementar, foi criada.
- c) Os programas Brasil Sorridente, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Farmácia Popular foram criados.
- d) Buscou-se fortalecer a produção nacional de insumos estratégicos para o SUS.
- e) Surgiu o Programa Mais Médicos para provimento de médicos em áreas de alta vulnerabilidade social e difícil fixação de profissionais.

10 - Assinale a alternativa que apresenta corretamente, de acordo com a Lei n.º 8.080, de 1990, um princípio do Sistema Único de Saúde e sua respectiva definição.

- a) Igualdade: assistência à saúde padronizada em todos os níveis da rede de saúde.
- b) Integralidade: sistema de referência e contrarreferência de informações em saúde.
- ▶ c) Universalidade: acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- d) Centralização político-administrativa: direção única pelo Ministério da Saúde.
- e) Longitudinalidade: capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**11 - O istmo das fauces é a abertura entre a cavidade oral e a parte oral da faringe. Assinale a alternativa correta quanto à sua formação e localização.**

- ▶ a) É delimitado inferiormente pelo sulco terminal da língua.
- b) É delimitado inferiormente pelo palato mole.
- c) É delimitado medialmente pelos arcos palatoglossos.
- d) O seu fechamento dificulta a ingestão de alimentos.
- e) Divide-se em um terço pré-sulcal e dois terços pós-sulcal.

12 - O palato mole continua posteriormente a partir do palato duro e age como uma válvula. Em relação à musculatura envolvida e suas origens, assinale a alternativa correta.

- a) O músculo levantador do véu palatino tem origem na porção posterior do canal carótico.
- b) O músculo tensor do véu palatino tem origem na superfície superior da parede palatina.
- c) O músculo palatoglossos tem origem na superfície superior da aponeurose palatina.
- d) O músculo palatofaríngeo tem origem na superfície inferior da aponeurose palatina.
- ▶ e) O músculo da úvula tem origem na espinha nasal posterior do palato duro.

13 - Assinale a alternativa correta sobre a inervação dos quatro seios paranasais anatomicamente encontrados na face.

- a) As células etmoidais são inervadas pelos ramos etmoidais anterior e posterior do nervo maxilar (V_2).
- b) Os seios frontais são inervados por ramos do nervo infraorbital provenientes do nervo oftálmico (V_1).
- ▶ c) As células etmoidais são inervadas por ramos orbitais do gânglio pterigopalatino e nervo maxilar (V_2).
- d) Os seios esfenoidais são inervados pelo ramo etmoidal anterior do nervo oftálmico (V_1) e maxilar (V_2).
- e) Os seios maxilares são inervados pelos ramos dos nervos alveolares superiores e oftálmico (V_1).

14 - Sobre os músculos da mastigação e suas funções, assinale a alternativa correta.

- a) O músculo pterigoideo lateral tem como função a protrusão e abertura da mandíbula.
- ▶ b) O músculo pterigoideo medial tem como função a elevação e lateralidade da mandíbula.
- c) O músculo temporal tem como função a elevação e protrusão da mandíbula.
- d) O músculo masseter tem como função a protrusão e lateralidade da mandíbula.
- e) O músculo pterigoideo lateral tem como função a protrusão e retrusão da mandíbula.

15 - Segundo Malamed (2013), apesar de raras, as fraturas de agulha nas anestésias locais acontecem, mas podem ser evitadas por cuidados que incluem:

- a) usar agulha 30 para bloqueio do nervo alveolar inferior em adultos.
- b) utilizar agulhas curtas na técnica de bloqueio do nervo alveolar inferior.
- c) realizar uma curvatura adequada na agulha para facilitar a técnica em adultos.
- d) evitar o uso da técnica do bloqueio do nervo alveolar inferior em crianças.
- ▶ e) inserir a agulha aquém do tecido mole no bloqueio do nervo alveolar inferior.

16 - O volume (em mililitros) recomendado na aplicação de técnicas anestésicas maxilares necessita de doses específicas. Na técnica anestésica do nervo:

- ▶ a) superoposterior é utilizado de 0,9 a 1,8 ml de anestésico.
- b) palatino maior é utilizado de 1,0 a 1,8 ml de anestésico.
- c) alveolar superior médio é utilizado de 0,6 a 1,6 ml de anestésico.
- d) alveolar superior médio anterior é utilizado de 1,0 a 1,4 ml de anestésico.
- e) superoanterior é utilizado de 1,0 a 1,4 ml de anestésico.

17 - Os vasoconstritores que não têm grupos OH nas terceiras e quartas posições da molécula aromática não são catecóis. Portanto, NÃO É uma catecolamina a:

- a) dopamina.
- b) adrenalina.
- c) noradrenalina.
- ▶ d) mefentermina.
- e) levonordefrina.

18 - Os pacientes com doença da artéria coronária (DAC) são, com frequência, identificados durante a anamnese e o exame físico. Quando a DAC é identificada antes de uma intervenção cirúrgica, são necessários exames complementares. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. A tomografia de tórax é solicitada para pesquisar cardiomegalia e derrame pleural.
2. Ecocardiografia transtorácica com Doppler deve ser solicitada.
3. Angiografia cardíaca faz parte dos exames pré-operatórios.
4. O ECG é solicitado para avaliar a hipertrofia atrial direita.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- ▶ b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

19 - Qualquer substância administrada na gestante deve ser considerada capaz de atravessar a placenta e penetrar na circulação fetal. Em relação à classificação de substâncias administradas em gestantes, existem aquelas com risco fetal cujo uso, apesar desse risco, é justificado. Marque a alternativa que descreve a classe dessas substâncias.

- a) Classe A.
- b) Classe B.
- c) Classe C.
- ▶ d) Classe D.
- e) Classe E.

20 - Os opioides são usados frequentemente em combinação com medicamentos sedativo-hipnóticos para proporcionar analgesia e aumentar o nível desejado de sedação/anestesia geral. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- ▶ a) A naxolona é utilizada para reverter a rigidez da parede torácica ou glótica.
- b) A remifentanila atua como antagonista e reversor quando combinada ao propofol.
- c) A mepiridina é utilizada com frequência para controlar os tremores pós-operatórios.
- d) A morfina apresenta alta solubilidade e tem início de ação rápido.
- e) A nalbufina induz a produção de histamina e severa depressão respiratória.

21 - Entre os princípios cirúrgicos em cirurgia maxilofacial, Hupp *et al.* (2015) recomendam cuidados especiais no manejo dos tecidos orais. Para prevenção:

- a) da necrose do retalho, a base deve ser menor que o cume (ponta).
- b) da deiscência de sutura, os bordos da ferida devem estar sob pressão.
- c) da hemorragia, faz-se primeiramente o uso de ligadura no local envolvido.
- d) do surgimento do edema, deve-se recomendar calor úmido no local imediato.
- ▶ e) da dilatação do retalho, deve-se manter o mesmo tamanho até o final.

22 - As situações mais comuns para o déficit neurológico do nervo mental são variáveis. Essa situações ocorrem:

1. na remoção cirúrgica dos toros mandibulares.
2. em cirurgias paraendodônticas dos incisivos.
3. nas cirurgias de osteotomia sagital.
4. em procedimentos de cirurgia pré-protética.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- ▶ c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

23 - De acordo com Miloro *et al.* (2016), o uso do óxido nitroso associado ao oxigênio proporciona ação ansiolítica e sedação leve. O limite de segurança da proporção N₂O/O₂ é respectivamente de:

- a) 30/70.
- b) 40/60.
- c) 50/50.
- d) 60/40.
- ▶ e) 70/30.

24 - Nas exodontias dos dentes maxilares eruptados, existem grupos dentários para os quais não se indica o uso de qualquer força rotacional devido ao risco de fratura. São eles:

- a) segundos pré-molares.
- ▶ b) primeiros pré-molares.
- c) incisivos centrais.
- d) incisivos laterais.
- e) caninos.

25 - Em cirurgia ortognática, uma das metas ortodônticas pré-cirúrgicas básicas é:

- a) realizar intrusões e extrusões como rotina.
- b) compensar dos elementos dentários anteriores.
- c) promover movimentações instáveis na maxila.
- ▶ d) evitar mecânica ortodôntica de classes II e III.
- e) aumentar os movimentos em pacientes jovens.

26 - A decisão por fazer ou não extrações dentárias no preparo ortodôntico para pacientes candidatos à cirurgia ortognática pode ser difícil, e vários fatores podem contribuir para essa determinação. Em relação ao tema, assinale a alternativa em que há indicação de exodontias.

- ▶ a) Nas discrepâncias do tamanho dentário significante.
- b) Nas assimetrias de arcos sem apinhamento.
- c) Nas atresias maxilares.
- d) Nas correções da curva de Spee.
- e) Nos dentes anteriores com inclinação diminuída.

27 - Considere as seguintes afirmativas sobre as etapas a serem seguidas na simulação cirúrgica assistida por computador em cirurgia ortognática:

1. criar modelos de TC-3D da mandíbula.
2. criar um registro de mordida.
3. juntar os modelos digitais nos modelos da TC.
4. criar um grupo de modelos digitais.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- ▶ d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

28 - Segundo Gil e Claus (2009), a cirurgia ortognática tem como objetivo corrigir a posição e tamanho dos maxilares, com melhora da oclusão, mastigação, fala e respiração. Em relação às características dessa cirurgia, assinale a alternativa correta.

- a) Os acessos cirúrgicos são extrabucais.
- ▶ b) O paciente necessita em média de sete dias de recuperação.
- c) Em cirurgias em mandíbula, é necessário sair de boca amarrada.
- d) Um cirurgião-dentista bem treinado está apto ao procedimento.
- e) A internação hospitalar ocorre entre três e cinco dias.

- 29 - A macroglossia pode causar deformidades dentoalveolares e instabilidade dos tratamentos ortodôntico e cirúrgico e criar problemas mastigatórios, de fala e de vias respiratórias. Uma característica radiográfica cefalométrica que indica a macroglossia é o:**
- a) desenvolvimento maxilar aumentado.
 - b) crescimento mandibular diminuído.
 - c) ângulo goníaco diminuído.
 - d) ângulo do plano oclusal mandibular diminuído.
 - ▶ e) ângulo do plano mandibular aumentado.
- 30 - Com relação à cirurgia ortognática, considere os seguintes objetivos:**
1. Maximizar a adaptação oclusal.
 2. Contribuir na correção das discrepâncias transversais.
 3. Auxiliar na minimização do edema dos tecidos bilaminares.
 4. Tracionar a musculatura da mastigação para melhor conforto.
- É/São objetivo(s) do uso de elásticos interarcos no pós-cirúrgico:**
- a) 2 apenas.
 - ▶ b) 1 e 3 apenas.
 - c) 1 e 4 apenas.
 - d) 2, 3 e 4 apenas.
 - e) 1, 2, 3 e 4.
- 31 - Em termos de excesso vertical, a característica que o candidato à cirurgia ortognática espera ver corrigida é a/o:**
- ▶ a) presença de incompetência labial.
 - b) ângulo mandibular pouco marcado.
 - c) sulco nasogeniano muito acentuado.
 - d) acúmulo tecidual submentoniano excessivo.
 - e) posição da mandíbula retroposta verticalmente.
- 32 - De acordo com Malamed (2016), a avaliação física mínima dos pacientes deve consistir na mensuração dos sinais vitais e inspeção visual. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um sinal vital.**
- a) Registro da temperatura corpórea.
 - b) Aferição da pressão sanguínea.
 - ▶ c) Aplicação do protocolo de ansiedade.
 - d) Realização da medida de altura.
 - e) Avaliação do índice de massa corporal.
- 33 - A hipotensão postural (ortostática) é a causa não relacionada ao estresse mais comum do estado de inconsciência. Na ausência de estresse, a circunstância em que a hipotensão postural ocorre é a:**
- a) síncope vasopressora.
 - b) insuficiência adrenal.
 - c) hiperventilação.
 - ▶ d) hipoglicemia.
 - e) epilepsia.
- 34 - Diferentemente da hiperglicemia, a hipoglicemia pode se desenvolver rapidamente, levando à perda de consciência em poucos minutos. Um de seus fatores desencadeantes é o/a:**
- a) ganho de peso.
 - b) terapia com corticoides.
 - ▶ c) insuficiência hepática.
 - d) hipertireoidismo.
 - e) infecção aguda.
- 35 - Em relação aos biomateriais e suas aplicações entre os materiais de enxertia mais utilizados, qual é o material que apresenta como vantagens as propriedades de osteocondução, osteoindução e osteogenicidade?**
- a) Homógeno.
 - ▶ b) Autógeno.
 - c) Heterógeno.
 - d) Aloplástico.
 - e) Heterólogo.
- 36 - São complicações associadas às fraturas de maxila que podem ocorrer semanas ou meses após o trauma, EXCETO:**
- a) epífora.
 - b) sinusite.
 - ▶ c) aneurisma.
 - d) maloclusão.
 - e) enoftalmo.

37 - Sobre as técnicas utilizadas no tratamento cirúrgico dos tumores dos maxilares, considere as seguintes afirmativas:

1. A ressecção marginal é a remoção com interrupção da continuidade do osso.
2. A ressecção parcial envolve remoção da porção de espessura total do osso.
3. A ressecção total é a remoção cirúrgica do osso envolvido.
4. A ressecção composta envolve o tumor, tecido mole e cadeias linfáticas contíguas.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- ▶ d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

38 - Segundo Miloro *et al.* (2016), o queratocisto odontogênico é uma forma distinta de cisto odontogênico de desenvolvimento que merece atenção por suas características histológicas e seu comportamento clínico. Sobre o assunto, marque a alternativa certa.

- ▶ a) Sua presença está associada à síndrome do carcinoma nevoide basocelular.
- b) O crescimento é resultado do aumento da pressão osmótica dentro do lúmen.
- c) O pico de prevalência da lesão é atingido entre a quarta e quinta década de vida.
- d) Tem característica radiográfica multilocular semelhante ao cisto dentífero.
- e) Possui uma camada uniforme de epitélio escamoso estratificado com 10 a 12 células.

39 - Segundo Hupp *et al.* (2015), as fraturas mandibulares normalmente ocorrem em diversas localizações, a depender do tipo de lesão e da direção da força do impacto. A fratura:

- a) em galho verde envolve o processo coronoide.
- b) favorável impede a resistência contra o deslocamento.
- c) desfavorável facilita a resistência ao deslocamento.
- d) simples é uma incompleta transecção da mandíbula.
- ▶ e) composta provém da exposição com o meio externo.

40 - De acordo com Miloro *et al.* (2016), o objetivo do tratamento das fraturas condilares é restaurar a função ao estado pré-lesão, sem interferir no reparo do sítio lesionado. A respeito desse tipo de fratura, considere as seguintes situações:

1. Luxação extracapsular lateral da cabeça do côndilo.
2. Fraturas bilaterais em que seja impossível determinar a oclusão adequada.
3. Fraturas em adultos nas quais é necessário restaurar a posição e função do menisco.
4. Incapacidade para trazer os dentes em oclusão por redução fechada.

As situações que têm indicação absoluta para tratamento com redução aberta são:

- a) 1 e 3 apenas.
- ▶ b) 1 e 4 apenas.
- c) 2 e 4 apenas.
- d) 2, 3 e 4 apenas.
- e) 1, 2, 3 e 4.